

フィナステリド服用 同意書

フィナステリド錠の内服方法と効果

1日1回内服し、半年後に判定を行うとされています。錠剤には0.2mg錠と1mg錠がありますが、国内の臨床試験でAGA患者に48週間投与した試験では、0.2mg錠で54.2%、1mg錠で58.3%の症例で改善を認めたと報告されています。当院では1mg錠を採用します。さらに、国内の臨床試験では、1mg錠を長期間患者の効果については、2年間で68%、3年間で78%の人に改善がみられ、現状維持についても2年間で31%、3年間で20%と報告されており、従って、改善効果と維持効果を合わせると98%の人に効果があると示されています。

フィナステリド錠の副作用

国内での臨床試験は1年間で4%の人に副作用が認められています。主な副作用は、リビドー現象(性欲減退)が1.1%、勃起不全が0.7%でした。まれに、胃の不快感、全身倦怠感などの肝機能障害も出現する可能性があります。このような場合には使用を中止して、すぐに医師の診察を受けてください。

フィナステリド錠の注意点

①男性のみ服用してください。女性には効果が認められていません。特に、妊娠中あるいは妊娠の可能性のある女性、授乳中の女性は服用しないでください。男性胎児の生殖器官の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。破損したフィナステリド錠に女性が触れても有効成分が吸収される場合がありますのでご注意ください。なお、錠剤は通常の扱いにおいては有効成分に触れることはありません。②20歳未満の安全性および有効性は確立されていません。③フィナステリド服用により、前立腺ガン検査で測定されるPSA値を約50%低下させます。従って、服用前に測定したPSA値の2倍の値を目安としてください。前立腺ガンの検診を受ける際は、検査を受ける前に医師にフィナステリドを服用していることお知らせください。④フィナステリド服用中は献血ができません。日本赤十字より注意喚起が行われています。献血する場合は服用を中止後1ヶ月は空けてください。⑤効果を持続させるためには継続的に服用する必要があります。服用を中止すると効果がなくなりAGA症状が進行します。

フィナステリド錠の注意点

フィナステリド錠を家族やほかの人にあげないでください。使用に関しては必ず医師にご相談ください。

目白れい皮膚科クリニック 院長 岡本玲子

— 以上の内容につき理解した上で、服用することに同意します。

同意日 年 月 日

本人住所 _____

本人氏名 _____